

BIXAN 0.25 MG

Insetticida-Acaricida in microgranuli bagnabili per il controllo di formiche, scarafaggi, pulci e zecche per uso in ambienti domestici e civili
Per uso professionale

BIXAN 0.25 MG

Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Piretrine pure	g	0,025
(pari a g 0,05 di Piretro al 50%)		
Piperonilbutossido puro	g	0,125
Coformulanti q.b. a	g	100

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P270** - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P273 Non disperdere nell'ambiente. **P391** Raccogliere il materiale fuoriuscito. **P501** Smaltire il prodotto/recipiente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ATTENZIONE



KWIZDA FRANCE S.A.S.

30, Avenue de l'Amiral Lemonnier - F-78160 Marly le Roi (France) / Tel: +33 1 39160969. Fax: + 33 1 39164707.

Officina di produzione

KWIZDA FRANCE S.A.S. - Val d'Izè (Francia); I.M.C. Limited di Naxxar (Malta)

Distribuito da:

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

Registrazione del Ministero della Salute n° 20291

Contenuto netto:

g 100, 200, 250, 300, 500, 750, 1kg, 1,5 kg 2 kg, 3 kg, 5 kg

Lotto n. _____ del _____

Validità: 2 anni a temperatura ambiente

Avvertenze: Non contaminare alimenti e bevande o utensili e superfici a contatto con alimenti. Non respirare gli aerosol lo spray di nebulizzazione. Non gettare i residui nelle fognature. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Lavare le mani e la pelle esposta prima dei pasti e dopo l'uso. Conservare in un luogo sicuro. Non toccare le superfici trattate fino a quando non siano asciutte - Non impiegare in agricoltura.

BIXAN 0.25 MG è un prodotto in microgranuli bagnabili d'uso professionale per il controllo a lungo termine di scarafaggi (*Blattella Germanica*, *B. Americana*, e *B. Orientalis*), formiche (*Formica nera*, *formica argentina*, *formica faraone*), pulci e zecche. **BIXAN 0.25 MG** agisce pochi minuti dopo l'applicazione, è inodore ed offre una grande flessibilità in quanto può essere applicato in 3 modi diversi: distribuzione tal quale, a spruzzo o per innaffiatura dopo diluizione in acqua.

Il prodotto è efficace contro i nidi di formiche la cui eliminazione avviene normalmente dopo circa una settimana dall'applicazione. **BIXAN 0.25 MG** contiene *denatonium benzoate*, agente amaricante atto a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini ed animali domestici.

CAMPI E DOSI DI IMPIEGO

Contro scarafaggi, zecche e pulci all'interno ed intorno agli edifici

Applicare il prodotto nei punti di passaggio degli insetti o dove si annidano, in angoli, nicchie, fessure, crepe, lungo battiscopa e dietro gli elettrodomestici: Per gli scarafaggi: tutti i posti caldi, umidi, bui favorevoli alla proliferazione. Per zecche e pulci: su tappeti, intorno alle cucce degli animali domestici. In caso di infestazione effettuare 1 trattamento curativo l'anno. In caso di reinfestazione, rinnovare l'applicazione ogni 2 settimane (1 mese per infestazione pulci). Non superare 6 trattamenti all'anno. Se le superfici trattate vengono pulite o sono esposte alle intemperie rinnovare l'applicazione fino alla fine dell'infestazione. Il prodotto è efficace per 2 settimane (1 mese per le pulci).

- Distribuzione tal quale: applicare un sottile strato di microgranuli in ragione di 80 g/m².
- **A spruzzo: in uno spruzzatore sciogliere 400 g di microgranuli in 1 litro d'acqua distribuendo il preparato su 5 m².**

Contro le formiche all'interno ed intorno agli edifici

Applicare il prodotto nei punti di passaggio o dove si annidano, lungo i muri, in crepe e fessure. In caso di infestazione effettuare 1 trattamento curativo l'anno. In caso di reinfestazione, rinnovare l'applicazione ogni 2 settimane. Non superare 6 trattamenti all'anno. Se le superfici trattate vengono pulite o sono esposte alle intemperie rinnovare l'applicazione fino alla fine dell'infestazione. Il prodotto è efficace per 1 mese.

- Distribuzione tal quale: applicare un sottile strato di microgranuli in ragione di 20 g/m².
- A spruzzo: in uno spruzzatore sciogliere 100 g di microgranuli in 1 litro d'acqua distribuendo il preparato su 5 m².

Contro i nidi di formiche (solo per applicazioni all'esterno)

Applicare il prodotto sopra ed intorno al nido. Se il nido non è completamente distrutto dopo qualche settimana procedere con una seconda applicazione (frequenza normale di applicazione: 1-2 / anno)

Piccoli nidi (superficie trattata: 1 m²)

- Distribuzione tal quale: Cospargere 20g di prodotto sul nido.
- A spruzzo: sciogliere in uno spruzzatore 20 g di prodotto in 200 ml di acqua trattando l'area del nido.
- Per innaffiatura: sciogliere 20 g di prodotto in 1 litro di acqua ed annaffiare la superficie del nido.

Grandi nidi (superficie trattata: 2m²)

- Distribuzione tal quale: Cospargere 40g di prodotto sul nido.
- A spruzzo: sciogliere in uno spruzzatore 40 g di prodotto in 400 ml di acqua trattando l'area del nido.
- Per innaffiatura: sciogliere 40 g di prodotto in 2 litri di acqua ed annaffiare la superficie del nido.

CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO DA NON VENDERSI SFUSO

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE**